

Trattamento smagliature. Nuovo tipo di formulazione peeling. Work in progress

Le smagliature (definite correttamente striae distensae) sono clinicamente e istologicamente paragonabili a vere e proprie cicatrici conseguenti ad un'anelasticità cutanea congenita o indotta da crescite repentinee o frequenti variazioni di peso che inducono, sovente drammaticamente, a rotture dermiche. Le smagliature colpiscono aree caratteristiche quali glutei, regione lombare, superficie interna della coscia, braccia addome, fianchi, seno. Gli autori presenteranno un nuovo approccio terapeutico in progress (circa 6 mesi di follow-up) consistente in una seduta al mese per 6 mesi con un nuovo peeling a base di un mix di acidi modulati (resorcinolo-lattico-salicilico) in grado di indurre un buon miglioramento di tutti gli aspetti clinici della smagliatura (colore, larghezza, profondità). Lo studio in questione è stato corredato di un questionario di autovalutazione pre e post trattamento, di rilievi fotografici con luce normale, polarizzata e di Wood. I risultati sono decisamente incoraggianti per utilizzare tale metodica anche da sola, senza l'utilizzo di tecnologie laser più invasive. Gli autori presenteranno i risultati di un primo gruppo pazienti trattati con questo peeling.

Dr. Matteo Basso, Dr.ssa Emanuela Di Lella