

## Strategie terapeutiche mediche e chirurgiche nei difetti estetici del mento

La regione mentoniera rappresenta la parte terminale del terzo inferiore del viso e risulta essere di notevole impatto estetico nell'armonia globale del viso stesso. Il mento, in particolare, è importante che abbia le giuste proporzioni con la regione frontale ed con il naso, al fine di una gradevole definizione del profilo. Esso può essere sede di inestetismi di vario genere, congeniti o acquisiti: scarsa definizione del profilo (ipomentonismo), eccessiva proiezione (ipermentonismo), asimmetria, oppure segni di invecchiamento particolarmente evidenti nel cosiddetto mento "senile". Infine possiamo trovarci spesso in presenza del cosiddetto mento da "strega", caratterizzato da accentuazione del solco sottomentoniero e ptosi dei tessuti molli del mento, in associazione ad aumento o riduzione della proiezione. La correzione dell'ipomentonismo può dunque prevedere una terapia medica di aumento di proiezione con filler, oppure una terapia chirurgica con uso di protesi mentoniere oppure la riduzione ossea nel caso di ipermentonismo.

L'Autore fa un'esamina dei principali difetti estetici che ci troviamo a correggere mediante l'utilizzo di tecniche di pertinenza sia della Medicina che della Chirurgia Estetica.

**Claudio Bernardi**  
**Chirurgia Plastica - Roma**

## Medical and surgical therapeutic strategies in the aesthetic defects of the chin

The chin region is the terminal part of the lower third of the face and appears to be of considerable aesthetic impact in the overall harmony of the face itself. The chin, in particular, is important that it has the right proportions with the frontal region and the nose, in order to have a pleasant definition of the profile. It may be the site of imperfections of various kinds, congenital or acquired: poor profile definition (hypomentonism), excessive projection (hypermentonism), asymmetry, or signs of aging particularly evident in the so-called "senile" chin. Finally we can often find ourselves in the presence of the so-called "witch" chin, characterized by accentuation of the submental groove and ptosis of the soft tissues of the chin, in association with increase or reduction of the projection. The correction of the hypomentonism can therefore provide a medical therapy to increase the projection with fillers, or a surgical treatment with the use of a chin rest or bone reduction in the case of hypermentonism.

The Author examines the main aesthetic defects that we find to correct through the use of techniques pertinent to both Medicine and Aesthetic Surgery.

**Claudio Bernardi**  
**Plastic Surgery - Rome**