

Peeling a base di Acido lattico 26%, Acido glicolico 20%, Acido Mandelico 5%, Acido Kojico 2% e Acido Salicilico 2% in combinazione con Redermalizzante per il trattamento dell'area periorale

La zona periorale, parte del terzo inferiore del volto, è un'area di difficile correzione, la sua integrità dipende da: arcata dentale, tono muscolare e buon trofismo del tessuto dermo-ipodermico. L'aging cutaneo comporta la comparsa più o meno precoce, soprattutto nel sesso femminile, di rughe intorno alla bocca a decorso verticale più marcate sul labbro superiore, anche denominate rughe verticali periorali o cosiddetto "codice a barre". Nel corso degli anni la causa della loro comparsa, nella maggior parte dei casi, è data dalla diminuzione della consistenza delle labbra e dalla ipotonicità del muscolo periorale. Le alterazioni di questo tessuto sono, inoltre, accelerate da fattori estrinseci come il sole, fumo, stress, mimica, queste iniziano come semplici rughettine, presenti solo durante i movimenti buccali, per poi evolvere in rughe profonde e ipotrofia tissutale.

Possiamo considerare diversi gradi di alterazioni dell'area periorale: 1) Fini rugosità nel labbro superiore solo durante la mimica. 2) Rughe presenti anche a riposo su tutto il labbro superiore. 3) Rughe più o meno profonde e destrutturazione dermo-epidermica. Per il trattamento di ristrutturazione di tali depressioni possiamo usare il ridensificante a base di acido ialuronico 15mg/ml crosslinkato e non crosslinkato più complesso dermoristrutturante o il filler dinamico a base di acido ialuronico 23 mg/ml crosslinkato. Le infiltrazioni possono essere eseguite con siringa classica o il nuovo device, la blanching technique consiste nell'introdurre l'ago solo per alcuni millimetri verticalmente alla superficie cutanea formando dei microdepositi con sbiancamento. I risultati si evidenziano con miglioramento dell'elasticità e idratazione ma soprattutto si mantiene l'effetto correttivo per un tempo più lungo. In conclusione la correzione di queste rughe del codice a barre ridona al volto un aspetto più giovanile valorizzando il sorriso.

P.P.Di Russo, M.G.Di Russo

Peeling based on lactic acid 26%, glycolic acid 20%, mandelic acid 5%, Kojico acid 2% and salicylic acid 2% in combination with redermalizing per the treatment of the perioral area

The superficial peeling is based on the association of: Lactic Acid 26%, Glycolic Acid 20%, 5% Mandelic Acid, Kojico Acid 2% and Salicylic Acid 2% the combination is multifunctional, each acid has its specific properties suitable to correct a particular aesthetic inestetism, the combination allows a synergistic therapeutic effect. The peeling comes in gel form, acts at the level of renewal of the epidermis, with minimal skin trauma in the absence of downtime.

Redermalization is an antiaging treatment of skin rejuvenation regulates biochemical processes, blocks free radicals and prevents dehydration. The mechanism of action is carried out on all aspects of the pathogenesis of aging: activation and recovery of metabolic processes, powerful antioxidant effect and restoration of water balance. It is used 1 fl of 1.5 ml of hyaluronic acid 0.55% (8.25mg) plus Succinic acid 1.6% (24mg) with 32G / 4mm needle. The implantation level is superficial intradermal, the technique is micropomfi. The low concentration of hyaluronic acid allows easy injection, without causing stable tissue edema. The indications are precisely the dehydration, the alteration of the vascular microcirculation, the loss of skin turgidity, the atony (tired skin), the small wrinkles, the crow's feet and the dark circles. The results are satisfactory both in the immediate and long term for the improvement of surface wrinkles, of the temporal area beyond the skin texture. The skin is younger and healthier, with improved color, skin texture and reduced wrinkle depth. Excellent patient compliance. This protocol, in particular, is highly appreciated by "toxinophobic" patients.

P.P.Di Russo, M.G.Di Russo

