

La rivalorizzazione del terzo medio del volto con tecniche riempitive

Maria Antonia Vivirito (1)

SIME, Medicina e Chirurgia, Roma, Italia (1)

Il terzo medio rappresenta un'area anatomica di fondamentale importanza nella valorizzazione del volto. La perdita di volume è responsabile di mancanza di armonizzazione, disproporzioni e disomogeneità. In base al quadro clinico e a un'attenta valutazione dipende un programma di riempimento personalizzato. Lo studio ha valutato per le diverse patogenesi e le caratteristiche morfologiche dei soggetti le principali caratteristiche da correggere, cercando di standardizzare, ove possibile, il processo di rivolumizzazione.

The revaluation of the middle third of the face with filling techniques

The middle third represents an anatomical area of fundamental importance in the revaluation of the face. Loss of volume is responsible for lack of harmonization, disproportion and inhomogeneity. A personalized filling program depends on the clinical picture and careful evaluation. The study evaluated the main characteristics to be corrected for the different pathogenesis and morphological characteristics of the subjects, trying to standardize the revolumization process where possible.

Reece EM, Rohrich RJ. The aesthetic jaw line: management of the aging jowl. *Aesthet Surg J*. 2008 Nov-Dec;28(6):668-74. doi: 10.1016/j.asj.2008.09.007. PMID: 19083596.

Gierloff M, Stöhring C, Buder T, Gassling V, Açil Y, Wiltfang J. Aging changes of the midfacial fat compartments: a computed tomographic study. *Plast Reconstr Surg*. 2012 Jan;129(1):263-273. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182362b96. PMID: 21915077.