

Dieta e binge-eating

Francesca Pietrocarlo (1)

ASL LATINA, MEDICINA E CHIRURGIA/ NEUROLOGIA e NEUROCHIRURGIA, LATINA, Italia (1)

OBIETTIVI: TROVARE UNA ADEGUATA TERAPIA , ANCHE COMBINATA,PER IL BINGE-EATING.

MATERIALI E METODI: PAZIENTE DI 48 ANNI, CON EPISODI DI COMPULSIONEALIMENTARE.DURANTE UN RICOVERO IN OSPEDALE,PRIMA DI UNA COLONSCOPIA PER UN SOSPETTO POLIPO INTESTINALE,UNA VOLTA EFFETTUATA LA DIETA PER L'ESAME E LA PREPARAZIONE,HA MANGIATO FUORI DIETA. L'INDAGINE E' STATA SOSPESA E RINVIATA.ALLE DIMISSIONI,DOPO UNA CONSULENZA PSICHIATRICA,E' STATO PRESCRITTO IL TOPIRAMATO E CONSIGLIATA ANCHE LA PSI COTERAPIA.

RISULTATI: IL TOPIRAMATO HA IN PARTE RIDOTTO IL DISTURBO E QUINDI IL PESO.

CONCLUSIONI: IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO COMBINATO CON LA PSICOTERAPIA HA CONTRIBUITO AL MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO FISICO DI MODO CHE NON SI SIA CREATA ANCHE UNA DISMORFOFOBIA.

DIET AND BINGE-EATING

OBJECTIVES: FIND A GOOD THERAPY ALSO COMBINED, FOR BINGE-EATING.

MATERIAL AND METHODS: PAZ. 48 YEAR OLD WITH ALIMENTARY COMPULSION. DURING AN HOSPITAL RECOVERY AFTER AN ENDOSCOPIC PREPARATION, HE HAS EATEN OUT OF DIET. BEFORE THE DIMISSION HE HAD A PSYCHIATRIC VISIT AND THEY PRESCRIBED TOPIRAMATE AND BEHAVIORAL THERAPY.

RESULT: TOPIRAMATE REDUCED EATING AND ALSO COMBINED WITH PSYCOTHERAPY.

CONCLUSION: THIS THERAPY COMBINED REDUCES THE HUNGER AND ALSO AVOID DISMORFOBIA.